

Nome Comercial: **DESOBESI-M**  
- ASTA MEDICA

<u><b>Apresentação</b></u>	<u><b>Composição</b></u>	<u><b>Informações Técnicas</b></u>	
<u><b>Indicações</b></u>	<u><b>Contra-indicações</b></u>	<u><b>Precauções</b></u>	<u><b>Interações</b></u>
<u><b>Reações Adversas</b></u>	<u><b>Posologia</b></u>	<u><b>Superdosagem</b></u>	<u><b>Bula Completa</b></u>

## **APRESENTAÇÃO**

Caixa com 20 cápsulas.

USO ADULTO

## **COMPOSIÇÃO**

Cada copo medida (10 ml) contém:

Cloridrato de femproporex.....25 mg

Excipientes: silicato de magnésio, estearato de magnésio, amido, dióxido de silício coloidal, goma laca decerada, óleo de rícino, sacarose, cápsula gelatinosa dura (constituída por gelatina, água purificada, laurilsulfato de sódio, dióxido de silício coloidal, ácido acético, corantes eritrosina e azul brilhante).

## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

Desobesi®-m tem como princípio ativo o femproporex, um agente simpatomimético com ação similar à Dexanfetamina.

Devido a sua ação anorexígena, tem sido utilizado como adjuvante no tratamento da obesidade.

Causa depressão do apetite e diminuição da acuidade pelo sabor e odor, o que leva a uma redução da ingestão de alimentos. Ocasionalmente causa aumento da atividade física, o que também contribui para a perda de peso.

O sítio de ação é, provavelmente, o centro hipotalâmico lateral.

## **FARMACOCINÉTICA:**

Após administração oral, Desobesi®-m é metabolizado à anfetamina. É amplamente absorvido pelo trato gastrointestinal e é distribuído a todos os tecidos, encontrando-se maiores concentrações a nível do S.N.C.

A via de excreção é a urinária. A eliminação é pH dependente, sendo aumentada na urina ácida.

## **INDICAÇÕES**

Desobesi®-m é indicado como anorexígeno no tratamento da obesidade.

## **CONTRA-INDICAÇÃO**

Desobesi®-m é contra-indicado a pacientes com distúrbios cardiovasculares, incluindo hipertensão moderada a severa e em pacientes com hipertireoidismo, glaucoma e alterações extrapiramidais. É contra-indicado a mulheres grávidas e em período de amamentação, pacientes com distúrbios psiquiátricos, epilepsia e alcoolismo crônico.

## **PRECAUÇÕES**

Não deve ser administrado a pacientes com história de abuso de drogas, a gestantes e a mulheres em período de amamentação. Deve ser administrado com cautela a pacientes com hipertensão leve, disfunção renal e personalidade instável.

Em crianças deve-se controlar freqüentemente a altura e o peso. Pacientes diabéticos devem ser monitorizados periodicamente.

A retirada do medicamento deve ser gradual quando o uso é

prolongado e com altas doses.

## **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS**

Lítio e a metiltirosina podem antagonizar os efeitos do Desobesi®-m

## **REAÇÕES ADVERSAS**

Sistema nervoso central: vertigem, tremor, irritabilidade, reflexos hiperativos, fraqueza, tensão, insônia, confusão, ansiedade e dor de cabeça.

Sistema cardiovascular: calafrios, palidez ou rubor das faces, palpitação, arritmia cardíaca, dor anginal, hipertensão ou hipotensão e colapso circulatório.

Trato gastrointestinal: boca seca, gosto metálico na boca, náusea, vômito, diarreia e câimbras abdominais.

Sistema endócrino: alteração da libido.

O uso crônico pode causar dependência psíquica e tolerância.

## **POSOLOGIA**

Tomar uma cápsula por dia, às 10 horas da manhã, ou a critério médico.

## **SUPERDOSAGEM**

Em caso de superdosagem, deve-se administrar cloreto de amônio a fim de que ocorra acidificação da urina e aumente a excreção do medicamento.

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

Desobesi®-m deve ser mantido em local fresco e seco, ao abrigo da luz, em sua embalagem original, para uma boa conservação.

Prazo de validade: 60 meses após a data de fabricação impressa na embalagem.

Ao adquirir um medicamento confira sempre o prazo de validade na embalagem externa do produto. Não tome nem utilize medicamentos cujo prazo de validade esteja vencido. Pode ser perigoso para sua saúde.

Ao iniciar o tratamento com Desobesi®-m, informe seu médico sobre as seguintes situações:

- seu histórico médico, ou seja: doenças que tem ou teve e tratamentos que segue (remédios que toma, dietas, etc.);
- ocorrência de gravidez, antes do início ou durante o tratamento, pois o medicamento não deve ser utilizado durante a gravidez;
- alergias que sofre, especialmente relativas ao emprego de medicamentos.

Os horários de administração do medicamento, assim como a dose a ser utilizada, devem ser rigorosamente seguidos. Caso ocorra alguma emergência, informe seu médico sobre o seu histórico clínico e os tratamentos que segue, inclusive o tratamento com Desobesi®-m.

No início do tratamento podem ocorrer fraqueza, cansaço e leve sonolência; no entanto estes sintomas podem ser originados pela dieta imposta.

Informe seu médico caso ocorram reações desagradáveis com o uso do produto.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO.**

**PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

Em caso de acidente, ou qualquer outra ocorrência de urgência, não deixe de informar ao médico que lhe atender sobre **TODOS OS MEDICAMENTOS** que utiliza, inclusive os que possam parecer

banais e sem importância.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA  
O ABUSO DESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR  
DEPENDÊNCIA

"SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO  
DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO  
MÉDICA".