

FAGOLIPO

MAZINDOL

(Comprimidos)

COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO

Cada comprimido contém:

Mazindol (DCB 0762.01-6)..... 2 mg.

Excipientes (celulose microfina, amido, estearato de magnésio, lactose, polividona e sílica coloidal)....
q.s.p.....1 comprimido.

Cartucho contendo 1 blister com 20 comprimidos de 2 mg.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

FAGOLIPO deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). protegido da luz e umidade.

O Prazo de Validade é de 24 meses após a Data de Fabricação impressa no cartucho. Não administre medicamento com a validade vencida.

FAGOLIPO é um moderador do apetite que, ao diminuir a sensação de fome, pode proporcionar equilibrada redução de peso quando associado à dieta de baixas calorias.

Informe seu médico se estiver grávida ou ocorrer gravidez durante o tratamento. As mulheres grávidas ou que amamentam não devem tomar esse produto. FAGOLIPO não é indicado para crianças abaixo de 12 anos.

Abstenha-se do uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento.

Não interrompa o tratamento repentinamente, nem altere a posologia sem o conhecimento de seu médico.

Informe seu médico caso ocorram reações como: palpitações, elevação da pressão sangüínea, tontura, cefaléia, insônia, excitação, náusea, secura da boca, constipação e fadiga. Estes efeitos ocorrem geralmente no início do tratamento, diminuindo com a continuidade do uso do medicamento e/ou a diminuição da dose.

Não tome outro medicamento durante o tratamento com FAGOLIPO, a não ser por expressa indicação de seu médico.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O Mazindol é um derivado tricíclico do imidazoisoindol com ação anorexígena.

A meia-vida de absorção é de 1 hora após administração oral. O pico plasmático se obtém em média entre 3 e 6 horas. A ligação às proteínas plasmáticas é de 77% e a meia-vida é de cerca de 10 horas.

Cerca de 45% da substância é eliminada através dos rins, sob a forma de metabólitos.

INDICAÇÕES

Obesidade em geral, principalmente nos casos de obesidade exógena, como coadjuvante em regimes de redução de peso que se fundamentam em restrições da ingestão alimentar.

CONTRA-INDICAÇÕES

É contra-indicado na gravidez ou durante a amamentação.

Glaucoma, hipersensibilidade ou idiosincrasia ao Mazindol, estados de agitação, pacientes com história progressiva de abuso de drogas (toxicomania), durante a administração de inibidores da mono-amino-oxidase, afecções renais, hepáticas ou cardíacas graves, quando o emprego desse tipo de substância normalmente não está indicado hipertensão moderada ou severa; uremia e isquemia cerebral.

EFEITOS COLATERAIS

Boca seca, constipação, nervosismo e insônia, devidos, em parte, à mudança dos hábitos alimentares. Essas reações, mais frequentes em pessoas sensíveis à substância, poderão ser controladas mediante redução da dose. Recomenda-se uma reavaliação do paciente pelo médico assistente, caso ocorram palpitações, taquicardia, enjôos, náuseas, reações comuns ao uso dos moderadores de apetite em geral.

PRECAUÇÕES

Nos diabéticos, a associação de um tratamento anorexígeno a um regime alimentar, pode modificar a glicemia. Pode ocorrer alteração de reação à insulina ou aos antidiabéticos orais, sendo necessário avaliar o metabolismo desses pacientes durante o tratamento.

Os pacientes psicóticos devem ser observados com rigor.

Pacientes que dirigem veículos ou trabalham com máquinas devem ser alertados para a possibilidade de ocorrer diminuição da atenção e perturbação dos reflexos durante o tratamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Os anorexígenos podem reforçar o efeito central dos estimulantes do SNC, dos hormônios tireoideanos ou da amantadina; os efeitos das catecolaminas exógenas; os efeitos simpaticomiméticos dos IMAO.

Os anorexígenos podem atenuar os efeitos hipotensores de certos antihipertensivos (como a clonidina, a guanetidina, a metildopa ou os alcalóides de rawolfia).

A administração de anorexígeno após uma anestesia por inalação (principalmente o halotano) pode provocar arritmias.

POSOLOGIA

Em geral, 1 comprimido de FAGOLIPO ao dia, aproximadamente 1 hora antes do almoço. De acordo com o caso, poderá ser administrado 1/2 a 1 comprimido, 1 a 2 horas antes do jantar. Outros esquemas posológicos deverão ser instituídos a critério médico.

SUPERDOSAGEM

Sintomas: náuseas, vômitos, cefaléias, taquicardia, arritmia, distúrbios respiratórios, problemas de micção, excitação, convulsões, coma.

Tratamento: lavagem gástrica e administração de carvão ativado. Tratamento sintomático dos problemas respiratórios e circulatórios.

Nos casos de excitação ou convulsão, administrar um barbitúrico de curta duração de ação ou um benzodiazepínico.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

O ABUSO DESTES MEDICAMENTOS PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA..

Data de fabricação, lote e validade: VIDE CARTUCHO

Reg. MS nº 1.0033.0013

Farmacêutico Responsável:

Dr. Lupércio Calefe - CRF - SP nº 6933.