

1. 以下哪一種病患是結直腸癌的高危險群 (A) 家族性腺性多發性息肉症 (B) 結直腸癌的兄弟姊妹 (C) 長期便秘 (D) 慢性鉛中毒。
2. 痔瘡手術的適應症: (A) 最大直徑超過 2 公分 (B) 常常覺得肛門搔癢 (C) 第三度上內痔脫出 (D) 以上皆是。
3. CEA 臨床上用於結直腸癌的 (A) 篩檢 (B) 診斷 (C) 術後追蹤 (D) 遺傳指標。
4. 在成年人，不是長期腎衰竭時，各種可能的情況，何者是正確：

尿比重 \ 尿液量	> 1.015	<1.015
<1ml/kg/hr	(甲)	(乙)
>1ml/kg/hr	(丙)	(丁)

- (A) 甲為脫水
  - (B) 乙為高血糖病患
  - (C) 丙為靜脈注射大量點滴
  - (D) 丁為重度營養不良
5. 手術後幾天內，護理人員統計 I/O 的意義，下列何者是對的？
    - (A) 訓練護理人員計算能力
    - (B) 計算每天靜脈注射輸液總量，以利醫院成本管理
    - (C) 間接觀察心臟搏出量，進而調整輸液量 (Preload)
    - (D) 以病人為中心，關心病患進食的情況